



MÁS ALLÁ DEL CET, ESTÁ USTED.

www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INDICACIÓN

AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos y a niños de 2 años en adelante con una afección genética denominada complejo de esclerosis tuberosa (CET), que experimentan cierto tipo de convulsiones (epilepsia), como un tratamiento adicional a otros medicamentos antiepilépticos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Los pacientes no deben tomar AFINITOR DISPERZ si son alérgicos al AFINITOR DISPERZ o a alguno de sus ingredientes. Si los pacientes son alérgicos al sirolimus (Rapamune®) o al temsirolimus (Torisel®), deben informárselo a su proveedor de atención médica antes de tomar AFINITOR DISPERZ.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

[Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.

Me llamo *Alee* 
...tengo CET

AFINITOR
DISPERZ™
2mg | 3mg | 5mg
(everolimus tablets
for oral suspension)



Me llamo **Alee** 
...tengo CET

La experiencia de **Alee** con las convulsiones por CET

Cuando Alee nació, parecía ser una beba completamente sana. Alee es la tercera hija de Mindee y Rafe, y era una beba feliz que pronto comenzó a habituarse a las rutinas normales de una familia animada y ocupada de Texas. Pero todo cambió en el quinto mes de vida.

Mindee se asustó por lo que comenzó a suceder. Cuando Alee se dormía, se sobresaltaba y brincaba. Y luego, temblaba. Al principio, solo sucedía ocasionalmente, pero pronto se volvió una rutina. Cada vez que Alee se dormía, temblaba.

Mindee sabía que algo estaba mal, pero ningún médico tenía la respuesta. Comenzó a dormir al lado de Alee con la mano apoyada en el pequeño pecho de su bebé, así podría saber cuándo sucedía. Ninguna de las dos podía dormir y Mindee estaba desesperada en busca de respuestas.

Luego, una noche, poco tiempo antes de su primer cumpleaños, Alee experimentó la primera convulsión importante. Comenzó a jadear con un sonido espantoso y agonizante que Mindee nunca olvidará. Mientras Mindee le realizaba RCP a su pequeña hija, Rafe llamó al 911. El viaje hasta el hospital, con sus otros 2 hijos pequeños en el asiento de atrás, fue como una pesadilla.

[continúa en la siguiente página]

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

- 2 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.




Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

LA EXPERIENCIA DE ALEE CON LAS CONVULSIONES POR CET



AFINITOR
DISPERZ[™]
2mg / 5mg / 10mg
(everolimus tablets
for oral suspension)



Cuando estaban allí, Mindee y Rafe se enteraron de que Alee tenía una convulsión importante que era muy difícil de controlar. Debía ser trasladada a otro hospital más equipado para tratar sus necesidades. Mientras ponían a su pequeña bebé, ahora sedada y entubada, en un helicóptero de Medevac, los jóvenes padres solo podían contemplar la escena con miedo y entre sollozos.

La semana siguiente, luego de muchas pruebas y consultas, Mindee escuchó las palabras que nunca olvidará. "Su hija padece complejo de esclerosis tuberosa".

Las semanas siguientes, Alee experimentó varias crisis convulsivas de inicio parcial todos los días. "Básicamente, comía, dormía y convulsionaba", dijo Mindee. "Íbamos al hospital 1 o 2 días por semana".

"Al principio, cuando recibí el diagnóstico, sentí que esto me superaba. Lloré mucho. Creo que lloré hasta el punto de no tener más lágrimas. Me sentía bastante insensible ante todo lo que sucedía en el mundo", comentó Mindee.

A esta altura, Alee había tomado varios medicamentos antiepilépticos (AED), pero las convulsiones no podían controlarse bien. Luego, Mindee se enteró de un centro especializado en el cuidado de pacientes con CET y solicitó un turno.



(continúa en la siguiente página)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral) puede causar efectos secundarios graves que hasta pueden causar la muerte. Si los pacientes experimentan estos efectos secundarios, es posible que deban interrumpir el uso de AFINITOR DISPERZ durante un tiempo o usar una dosis más baja. Los pacientes deben seguir las instrucciones de sus proveedores de atención médica.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

- 3 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

LA EXPERIENCIA DE ALEE CON LAS CONVULSIONES POR CET



AFINITOR
DISPERZ™
2mg / 5mg / 15mg
(everolimus tablets
for oral suspension)



Cuando estaban en el centro, el médico le administró a Alee un medicamento con el cual se logró reducir un poco la frecuencia de las convulsiones. Sin embargo, incluso con este progreso, la vida de Alee era muy difícil. Su familia sabía cuándo tendría una convulsión. Durante esos años, continuó teniendo varias convulsiones importantes que terminaban en una visita al servicio de urgencias.

“Alee aún padecía algunas convulsiones. Cada día, cada semana, muchas en un mes. Para nosotros, era normal. Nuestros hijos no conocían otra cosa”, dijo Mindee.

Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Alee tenía 5 años. En ese momento, el médico sugirió que la inscribieran en un ensayo clínico de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral), que se estaba estudiando en personas que no obtuvieron resultados con 2 o más AED.

Mindee recuerda: “Cuando comenzamos el tratamiento con AFINITOR DISPERZ, Alee sufría muchas convulsiones por día. Después de unos meses, nos dimos cuenta de que habían disminuido. Y eso era emocionante. Por otro lado, después de aproximadamente 8 o 9 meses, las convulsiones disminuyeron aún más”.

Cuando tomaba AFINITOR DISPERZ, Alee tenía llagas bucales que es el efecto secundario más común. Luego, cuando el médico de Alee le recetó un medicamento para que utilice como enjuague bucal, las llagas desaparecieron.

(continúa en la siguiente página)

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

4 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

LA EXPERIENCIA DE ALEE CON LAS CONVULSIONES POR CET



AFINITOR
DISPERZ™
2mg / 2mg / 1mg
(everolimus tablets
for oral suspension)

Al final del primer año del ensayo clínico, Alee había mostrado progreso. Y ahora, continúa el tratamiento con AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral).

Mindee y Alee siguen asistiendo a citas con diferentes médicos y continúan con la medicación.

“Creo que es una elección que haces todos los días”, expresó Mindee. “Tienes que decidir que no vas a dejar que la esclerosis tuberosa controle tu vida. Simplemente tenemos que pasar cada día tal como se presenta”.



Mire el video de Alee en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta lo siguiente:

Puede desarrollar problemas pulmonares o respiratorios. En algunas personas, los problemas pulmonares o respiratorios pueden ser graves y hasta causar la muerte. Infórmele de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas: nueva tos o empeoramiento de la tos, falta de aire, dolor en el pecho, dificultad para respirar o sibilancias.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

- 5 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.

“Cuando comenzamos el tratamiento con AFINITOR DISPERZ, Alee sufría muchas convulsiones por día. Después de unos meses, nos dimos cuenta de que habían disminuido. Y eso era emocionante. Por otro lado, después de aproximadamente 8 o 9 meses, las convulsiones disminuyeron aún más”.
—Madre de Alee, Mindee



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures



Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

- 6 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures



CONVULSIONES
POR CET

AFINITOR DISPERZ

Conozca los detalles sobre cómo AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) puede ser una ayuda en ciertos tipos de convulsiones por CET, como un tratamiento adicional a otros medicamentos antiepilépticos.

EFFECTOS SECUNDARIOS
DE AFINITOR DISPERZ

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta lo siguiente:

Puede aumentar la probabilidad de que desarrolle una infección, como neumonía, o una infección bacteriana, fúngica o viral. Las infecciones virales pueden incluir la reactivación de la hepatitis B en personas que ya hayan padecido esta enfermedad. En algunas personas (incluidos adultos y niños), estas infecciones pueden ser graves y hasta causar la muerte. Es posible que deba tratarse lo antes posible. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si alcanza los 100.5 °F de temperatura o más, si tiene escalofríos o si no se siente bien. Los síntomas de la hepatitis B o de una infección pueden incluir lo siguiente: fiebre, escalofríos, sarpullido, dolor e inflamación en las articulaciones, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, heces pálidas u orina oscura, piel amarillenta o dolor en el lado superior derecho del estómago.

CÓMO TOMAR
AFINITOR DISPERZ

APOYO PARA PACIENTES

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

7 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

MANTÉNGASE INFORMADO

Usted o algún ser querido puede padecer CET. Además, tiene la capacidad de involucrarse y tener un papel proactivo para lograr los objetivos del tratamiento. Al mantenerse enfocado y colaborar con su equipo de atención médica, puede aprender sobre la afección, entender el tratamiento y asegurarse la mejor atención médica posible.

AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral), combinado con otros medicamentos para convulsiones, está aprobado para el tratamiento de convulsiones por CET de inicio parcial, lo que significa que afectan un lado del cerebro. A través de este folleto puede conocer más sobre AFINITOR DISPERZ y entender qué esperar durante el tratamiento.

Asuma su papel en la búsqueda del tratamiento correcto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta lo siguiente:

Reacciones alérgicas graves. Las personas tratadas con AFINITOR DISPERZ pueden presentar reacciones alérgicas graves. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene signos y síntomas de una reacción alérgica grave como, por ejemplo, los siguientes: sarpullido, comezón, urticaria, enrojecimiento, problemas para respirar o para tragar, dolor en el pecho o mareos.

Mayor riesgo posible de padecer un tipo de reacción alérgica denominada angioedema en las personas que durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ tomen un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Si tiene dudas sobre si está tomando un medicamento inhibidor de la ECA, hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar AFINITOR DISPERZ. Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene problemas para respirar o si siente tumefacción de lengua, boca o garganta durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

8 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures



Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

- 9 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

CET Y LAS CONVULSIONES

Si usted o un ser querido sufren CET y convulsiones, no están solos. Esto es porque las convulsiones son el síntoma cerebral más común del CET.

La mayoría de las personas que sufren CET comienzan con convulsiones de bebés o niños pequeños. Pero, aproximadamente el 12% de las personas que padecen CET que no experimentaron convulsiones en su niñez, presentan la primera convulsión de adultos.

Las personas que padecen CET pueden presentar cualquier tipo de convulsión. La mayoría de las personas con CET presenta un tipo de convulsión denominada de inicio parcial, que afecta solamente una parte del cerebro. Independientemente del tipo de convulsión que usted o el miembro de su familia presente, es muy importante tratar la afección con un neurólogo. AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) está aprobado para tratar a adultos y a niños de 2 años y más que presentan ciertos tipos de convulsiones por CET (epilepsia), como un tratamiento adicional a otros medicamentos antiepilépticos.



Aproximadamente el **85%**
de las personas con
CET presenta convulsiones

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

10 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.




Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

CET Y LAS CONVULSIONES (continuación)


ENTENDER LA CAUSA DEL CET

Sin CET




Los genes *TSC1* y *TSC2* generan **PROTEÍNAS** para controlar la **mTOR** y el crecimiento **CELULAR**.

Con CET



Los genes *TSC1* y *TSC2* defectuosos no generan **PROTEÍNAS**, lo que causa un crecimiento **CELULAR** descontrolado. Cuando las células crecen sin control, se pueden desarrollar convulsiones en el cerebro.

Con CET [personas tratadas con AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral)]



AFINITOR DISPERZ controla la **mTOR**.

mTOR, diana de rapamicina en células de mamífero.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta lo siguiente:

Puede desarrollar insuficiencia renal. En algunas personas, puede ser grave y hasta causar la muerte. Los pacientes deben someterse a pruebas para controlar su función renal antes y durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

11 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

AFINITOR DISPERZ: UN MEDICAMENTO PARA CIERTOS TIPOS DE CONVULSIONES POR CET

AFINITOR
DISPERZ[™]
2mg | 5mg | 10mg
(everolimus tablets
for oral suspension)



AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral) es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos y a niños de 2 años en adelante con una afección genética denominada complejo de esclerosis tuberosa (CET), que experimentan cierto tipo de convulsiones (epilepsia), como un tratamiento adicional a otros medicamentos antiepilépticos.



Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

12 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

AFINITOR DISPERZ: UN MEDICAMENTO PARA CIERTOS TIPOS DE CONVULSIONES POR CET (continuación)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral), infórmele a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene o ha tenido problemas renales.
- Tiene o ha tenido problemas hepáticos.
- Tiene diabetes o un nivel alto de azúcar en sangre.
- Tiene niveles altos de colesterol en sangre.
- Tiene cualquier infección.
- Ya ha tenido hepatitis B.
- Tiene programado recibir alguna vacuna. No debe recibir una vacuna viva ni estar cerca de personas que hayan recibido recientemente una vacuna viva mientras se esté tratando con AFINITOR DISPERZ. Si tiene dudas sobre el tipo de vacuna o inmunización que recibió, pregúntele a su proveedor de atención médica. En el caso de niños con CET y SEGA, o con ciertos tipos de convulsiones, trabaje con su proveedor de atención médica para completar la serie de vacunas recomendadas antes de que su hijo comience el tratamiento con AFINITOR DISPERZ.
- ¿Está embarazada, podría quedar embarazada o su pareja podría quedar embarazada? AFINITOR DISPERZ puede dañar a su bebé en gestación. Si es una mujer que puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo eficaz mientras se trate con AFINITOR DISPERZ y durante 8 semanas luego de su última dosis. Si es hombre y su pareja es mujer, debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y por 4 semanas luego de la última dosis. Converse con su proveedor de atención médica acerca de las opciones anticonceptivas mientras toma AFINITOR DISPERZ.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

13 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

CUANDO SE AGREGA A LOS MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS ACTUALES DEL PACIENTE,

AFINITOR DISPERZ AYUDA A QUE LOS PACIENTES TENGAN MENOS CONVULSIONES

Estudio EXIST-3

AFINITOR
DISPERZ[™]
2mg | 5mg | 10mg
(everolimus tablets
for oral suspension)

En un estudio clínico denominado EXIST-3, se evaluó el medicamento AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) para determinar si era efectivo y seguro cuando se agregaba al medicamento anticonvulsivo actual del paciente.

En el estudio se mostró que cuando AFINITOR DISPERZ se tomaba junto con otros medicamentos anticonvulsivos, ayudaba a reducir la frecuencia de las convulsiones a lo largo de 12 semanas.

En el estudio había 3 grupos de pacientes que recibieron un tratamiento: placebo (píldora de azúcar), dosis alta de AFINITOR DISPERZ y dosis baja de AFINITOR DISPERZ.

Después de 12 semanas, el **40% de los pacientes en el grupo de dosis alta de AFINITOR DISPERZ tuvo menos convulsiones** que antes del tratamiento con AFINITOR DISPERZ. **Alrededor del 29% de los pacientes en el grupo de dosis baja de AFINITOR DISPERZ tuvo menos convulsiones**, tal como sucedió en cerca del 15% de los pacientes en el grupo de placebo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar AFINITOR DISPERZ, infórmelo a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está amamantando o planea hacerlo. Durante el tratamiento y 2 semanas luego de su última dosis, no debe amamantar.
- ¿Está planeando realizarse una cirugía o se sometió a una cirugía recientemente? Debería dejar de tomar AFINITOR DISPERZ al menos 1 semana antes de la cirugía programada.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

14 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.

PORCENTAJE DE PACIENTES CON MENOS CONVULSIONES



Grupo de dosis
alta de AFINITOR
DISPERZ
(130 pacientes)



Grupo de dosis
baja de AFINITOR
DISPERZ
(117 pacientes)



Grupo de placebo
(119 pacientes)



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

CUANDO SE AGREGA A LOS MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS ACTUALES DEL PACIENTE,

AFINITOR DISPERZ AYUDA A QUE LOS PACIENTES

TENGAN MENOS CONVULSIONES (continuación)

Estudio EXIST-3



En el estudio también se midió cuántos pacientes presentaron menos convulsiones cada semana en los grupos de placebo y de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral).

CANTIDAD PROMEDIO DE CONVULSIONES CADA SEMANA (MEDIANA)

	Grupo de placebo (119 pacientes)	Grupo de dosis baja de AFINITOR DISPERZ (117 pacientes)	Grupo de dosis alta de AFINITOR DISPERZ (130 pacientes)
Al inicio del estudio	10.5	8.6	9.5
Durante el estudio	8.5	6.8	4.9

LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES EN LOS 2 GRUPOS DE AFINITOR DISPERZ FUERON SIMILARES, INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAS 6 CARACTERÍSTICAS:

1 Edad	4 Tipos de convulsiones
2 Sexo	5 Con qué frecuencia tuvieron las convulsiones al inicio del estudio
3 Raza y etnia	6 La cantidad de medicamentos antiepilépticos que tomaban

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

15 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) puede causar efectos secundarios graves.

Estos efectos secundarios graves incluyen:

- **Puede desarrollar problemas pulmonares o respiratorios.** En algunas personas, los problemas pulmonares o respiratorios pueden ser graves y hasta causar la muerte. Infórmele de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene alguno de estos síntomas: nueva tos o empeoramiento de la tos, falta de aire, dolor en el pecho, dificultad para respirar o sibilancias.
- **Puede aumentar la probabilidad de que desarrolle una infección,** como neumonía, o una infección bacteriana, micótica o viral. Las infecciones virales pueden incluir la reactivación de la hepatitis B en personas que ya hayan padecido esta enfermedad. En algunas personas (incluidos adultos y niños), estas infecciones pueden ser graves y hasta causar la muerte. Es posible que deba tratarse lo antes posible. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si alcanza los 100.5 °F de temperatura o más, si tiene escalofríos o si no se siente bien. Los síntomas de la hepatitis B o de una infección pueden incluir lo siguiente: fiebre, escalofríos, sarpullido, dolor e inflamación en las articulaciones, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, heces pálidas u orina oscura, piel amarillenta o dolor en el lado superior derecho del estómago.
- **Reacciones alérgicas graves.** Las personas tratadas con AFINITOR DISPERZ pueden presentar reacciones alérgicas graves. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene signos y síntomas de una reacción alérgica grave como ser, entre otros, sarpullido, comezón, urticaria, enrojecimiento, problemas para respirar o para tragar, dolor en el pecho o mareos.
- **Mayor riesgo posible de padecer un tipo de reacción alérgica denominada angioedema** en las personas que durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ tomen un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Si tiene dudas sobre si está tomando un medicamento inhibidor de la ECA, hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar AFINITOR DISPERZ. Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene problemas para respirar o si siente tumefacción de lengua, boca o garganta durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ.
- **Puede desarrollar insuficiencia renal.** En algunas personas, puede ser grave y hasta causar la muerte. Los pacientes deben someterse a pruebas para controlar su función renal antes y durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ.

Si experimenta alguno de los efectos secundarios graves antes mencionados, es posible que deba interrumpir el consumo de AFINITOR DISPERZ durante un tiempo o disminuir la dosis. Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

16 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Infórmele a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales. El consumo de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) con determinados medicamentos puede tener efectos secundarios graves. Confeccione una lista de los medicamentos que toma y muéstresela a su proveedor de atención médica cuando reciba un medicamento nuevo. En especial, infórmele a su proveedor de atención médica si toma hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), medicamentos que debilitan su sistema inmunológico (la capacidad de su organismo de luchar contra las infecciones y otros problemas) o medicamentos para tratar lo siguiente:

- Infecciones fúngicas
- Infecciones bacterianas
- Tuberculosis
- Convulsiones
- VIH-SIDA
- Afecciones cardíacas o hipertensión

Pregúntele a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico si no está seguro acerca de si su medicamento es uno de los que se toman para las afecciones antes mencionadas. Si está tomando algún medicamento para las afecciones antes mencionadas, es posible que su proveedor de atención médica deba recetarle uno diferente o que se deba modificar la dosis de AFINITOR DISPERZ. Infórmele a su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar un medicamento nuevo.

No debe beber jugo de pomelo ni comer pomelo durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ. Esto puede hacer que la cantidad de AFINITOR DISPERZ en sangre aumente a un nivel peligroso.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

17 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ (continuación)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Posibles efectos secundarios de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral):

AFINITOR DISPERZ puede causar efectos secundarios graves.

- **Riesgo de problemas de cicatrización.** Es posible que las heridas no cicatricen adecuadamente durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ. Comuníquese a su proveedor de atención médica si planea realizarse una cirugía antes de comenzar o durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ. Debería dejar de tomar AFINITOR DISPERZ al menos 1 semana antes de la cirugía programada. Su proveedor de atención médica deberá decirle cuándo puede reanudar el consumo de AFINITOR DISPERZ luego de la cirugía.
- **Aumento de los niveles de azúcar y grasa (colesterol y triglicéridos) en sangre.** Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre para controlar sus niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos en sangre en ayunas, antes de comenzar el tratamiento con AFINITOR DISPERZ y en el transcurso de este.
- **Disminución en los recuentos de células sanguíneas.** AFINITOR DISPERZ puede provocar una disminución en los hematíes, leucocitos y plaquetas. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre para controlar su recuento de células sanguíneas antes de comenzar el tratamiento con AFINITOR DISPERZ y en el transcurso de este.

Los efectos secundarios más comunes de AFINITOR DISPERZ incluyen:

- **Úlceras bucales:** AFINITOR DISPERZ puede provocar úlceras y llagas bucales. Cuando comience el tratamiento con AFINITOR DISPERZ, su proveedor de atención médica también puede indicarle que comience a usar un enjuague bucal con receta para reducir la posibilidad de que se produzcan úlceras o llagas bucales y para reducir su gravedad. Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica sobre cómo utilizar este enjuague bucal recetado. Si siente dolor, molestias o tiene llagas abiertas en la boca, infórmele a su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica puede indicarle que reanude el uso de este enjuague bucal o que utilice un gel o enjuague bucal especial que no contenga alcohol, peróxido de hidrógeno, yodo o tomillo.
- **Infección de las vías respiratorias**

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

18 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ (continuación)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Otros efectos secundarios que pueden surgir por el uso de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral):

- Amenorrea (ausencia de menstruación). Las mujeres pueden saltarse 1 o más períodos menstruales. Si esto ocurre, dígaselo a su proveedor de atención médica.
- La fertilidad puede verse afectada en las mujeres, así como también la capacidad de quedar embarazada. Si esto le preocupa, converse con su proveedor de atención médica.
- La fertilidad puede verse afectada en los hombres, así como también la capacidad de ser padre. Si esto le preocupa, converse con su proveedor de atención médica.

Comuníquese con su proveedor de atención médica si experimenta algún efecto secundario que lo incomode o que no cese.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de AFINITOR DISPERZ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda que informe los efectos secundarios negativos del medicamento prescrito a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Las marcas mencionadas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y no son marcas comerciales o marcas registradas de Novartis.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

19 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS

El efecto secundario más común de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) en personas que sufren convulsiones por CET es las llagas bucales (también denominadas úlceras). Su médico puede referirse a esto como *estomatitis*. Antes de comenzar el tratamiento, y durante este, su médico puede sugerirle cuidados bucales y qué comidas evitar. En la siguiente página, hay consejos que usted y su médico pueden tener en cuenta para tratar las llagas bucales. Pregúntele a su médico cuáles de estas sugerencias son apropiadas para niños pequeños.

Hable con su médico de inmediato si tiene alguna pregunta o inquietud. Si tiene un hijo pequeño, algunos de estos consejos no son apropiados; hable con su médico para obtener ayuda. Su médico o enfermera también pueden recetarle una solución oral de dexametasona libre de alcohol para ayudar a tratar las llagas bucales.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

20

Haga clic aquí para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS (continuación)

CONSEJOS PARA TRATAR LAS LLAGAS BUCALES

SÍ



Coma alimentos blandos (como batidos de helado, batidos de fruta, pudín, yogur, puré de papas o bananas).



Cuide de su boca y visite al dentista periódicamente.



Intente cepillarse los dientes después de cada comida con un cepillo de dientes de cerdas blandas y una pasta dental suave.



Utilice hilo dental a menudo.



Enjuáguese la boca varias veces por día con una mezcla de sal de mesa y agua.



Consulte con un médico, enfermero o farmacéutico antes de usar un enjuague bucal comprado en una tienda.

NO



Los alimentos y las bebidas que pueden irritar la boca (como las frutas y los jugos cítricos, los tomates, los alimentos picantes o salados, el jengibre crudo, las cebollas y los bocadillos crujientes).



El enjuague bucal que contiene alcohol, peróxido de hidrógeno, yodo, o tomillo, porque puede irritar la boca.



Bebidas calientes.



Alimentos a los cuales es alérgico y no olvide sus restricciones dietéticas.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ (continuación)



CONSEJOS SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DE AFINITOR DISPERZ:

Con AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral), puede tener efectos secundarios. Por eso, es importante hablar frecuentemente con su médico. En caso de presentar efectos secundarios, usted puede crear un plan de manejo terapéutico.

Algunas personas experimentan muchos efectos secundarios, mientras que otras presentan pocos. Puede resultar útil tener un diario donde anotar sus experiencias.

- AFINITOR DISPERZ funciona de manera diferente en comparación con otros tratamientos que haya realizado, y puede causar efectos secundarios que desconoce.
- Infórmele a su médico si experimenta algún efecto secundario que lo incomode o que no cese.
- Su médico o enfermera pueden indicarle la interrupción temporaria del tratamiento hasta que los síntomas mejoren y luego, ajustar su dosis como corresponde.

Se recomienda que informe los efectos secundarios negativos del medicamento prescrito a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

22 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE AFINITOR DISPERZ (continuación)

AFINITOR
DISPERZ[™]
2mg | 5mg | 10mg
(everolimus tablets
for oral suspension)

LA COMUNICACIÓN CON SU EQUIPO MÉDICO

Sabemos que es importante que pueda sostener el tratamiento. Por eso recomendamos las visitas regulares, los exámenes de revisión y las charlas con su equipo médico.

Su médico puede ajustar la dosis para encontrar la concentración de AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral) que es adecuada para usted. No debe cambiar ni ajustar la dosis por su cuenta. Siga siempre las instrucciones del médico y comuníquese con su médico o enfermera si tiene algún problema.



Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. También puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.



Puede resultar útil tener un diario donde anotar sus experiencias.



Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

23 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

CÓMO TOMAR AFINITOR DISPERZ

La dosis inicial recomendada es 5 mg/m² una vez al día, pero su médico le recetará la dosis de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) que sea adecuada para usted o para su ser querido. AFINITOR DISPERZ no reemplaza los otros medicamentos anticonvulsivos que usted o su ser querido tomen. Si no que, debe agregarse a sus medicamentos de rutina.

Tome AFINITOR DISPERZ exactamente como su médico le indica. De ser necesario, su médico podrá modificar la dosis o indicarle una interrupción temporaria del consumo del medicamento.

TÓMELO DE LA SIGUIENTE MANERA:



Tome AFINITOR DISPERZ una vez al día a alrededor de la misma hora.



Tome AFINITOR DISPERZ de la misma forma siempre, ya sea con o sin comida.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO



Si su médico le receta AFINITOR DISPERZ, consulte las “Instrucciones de uso” que vienen con el medicamento para saber cómo preparar y cómo tomar su dosis.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.



CÓMO TOMAR AFINITOR DISPERZ (continuación)

PREPARE LA DOSIS CON CUIDADO



Cada dosis de AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral) debe prepararse como una **suspensión** (una mezcla del medicamento + un líquido) antes de administrarse. Prepare la suspensión solamente en agua.



Use tijeras para abrir el blíster.



AFINITOR DISPERZ puede dañar al bebé en gestación. Siempre que sea posible, una persona adulta que no esté embarazada ni que planea quedar embarazada debe preparar la suspensión.



Cualquiera que prepare las suspensiones de AFINITOR DISPERZ para otra persona debe utilizar guantes para evitar el posible contacto con el medicamento.

Si toma AFINITOR DISPERZ en exceso, comuníquese con su proveedor de atención médica o concurra de inmediato al servicio de urgencias del hospital más cercano. Lleve el paquete de AFINITOR DISPERZ.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

25 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

UTILICE UNA JERINGA ORAL O UN VASO DE VIDRIO PEQUEÑO

CÓMO USAR UNA JERINGA ORAL PARA PREPARAR LA SUSPENSIÓN

1

Coloque la dosis recetada de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) en una jeringa de 10 ml. No utilice más de una dosis total de 10 mg por jeringa. Si le recetaron una dosis mayor que 10 mg, prepare una jeringa adicional. No rompa ni aplaste los comprimidos.

2

Cargue la jeringa con aproximadamente 5 ml de agua y 4 ml de aire.

3

Coloque la jeringa cargada en un recipiente con la punta hacia arriba por 3 minutos, hasta que los comprimidos de AFINITOR DISPERZ estén en suspensión.

4

Suavemente invierta la jeringa 5 veces inmediatamente antes de administrar la dosis.

5

Después de administrar la suspensión preparada, cargue la misma jeringa con aproximadamente 5 ml de agua y 4 ml de aire, y agite el contenido con movimientos circulares para suspender las partículas restantes. Luego, administre el contenido restante de la jeringa.

Se le deben realizar análisis de sangre antes de comenzar a tomar AFINITOR DISPERZ y durante el tratamiento. Estos incluyen pruebas para controlar el recuento de células sanguíneas, la función renal y hepática, el colesterol y los niveles de azúcar en sangre.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

26 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

UTILICE UNA JERINGA ORAL O UN VASO DE VIDRIO PEQUEÑO (continuación)

UTILICE UN VASO DE VIDRIO PEQUEÑO

1	Coloque la dosis recetada de AFINITOR DISPERZ® (everolimus comprimidos suspensión para oral) en un vaso pequeño con aproximadamente 25 ml de agua (el vaso no debe exceder los 100 ml [alrededor de la mitad de una taza]). No utilice más de una dosis total de 10 mg de AFINITOR DISPERZ por vaso. Si se recetó una dosis mayor que 10 mg, prepare un vaso adicional. No rompa ni aplaste los comprimidos.
2	Deje reposar por 3 minutos hasta que se produzca la suspensión.
3	Revuelva el contenido suavemente con una cuchara, justo antes de beberlo.
4	Luego de beber la suspensión preparada, agregue 25 ml de agua al vaso y revuelva con la misma cuchara para volver a suspender las partículas restantes. Luego, debe beber todo el contenido del vaso.

EVITE SALTARSE UNA DOSIS

- Si no toma una de las dosis de AFINITOR DISPERZ, puede hacerlo si transcurrieron menos de 6 horas después del horario en que normalmente toma la dosis. Si transcurrieron más de 6 horas después del horario en que normalmente toma la dosis de AFINITOR DISPERZ, ese día no la tome. Al día siguiente, tome AFINITOR DISPERZ en el horario habitual.
- No tome 2 dosis para compensar la dosis que olvidó.
- Si no está seguro de qué hacer, llame a su médico o enfermera.

OTRAS COSAS IMPORTANTES QUE DEBE SABER

-  No beba jugo de pomelo ni coma pomelo durante el tratamiento con AFINITOR DISPERZ. Esto puede hacer que la cantidad de AFINITOR DISPERZ en sangre aumente a un nivel peligroso.
-  Evite colocarse vacunas vivas y el contacto con personas que recibieron este tipo de vacunas. Si tiene dudas sobre el tipo de vacuna, pregúntele a su médico o enfermera.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.



AFINITOR DISPERZ OFRECE EL APOYO PARA PACIENTES QUE USTED NECESITA



Programa de apoyo para pacientes que toman AFINITOR o AFINITOR DISPERZ

A veces, acceder a los medicamentos puede ser difícil o confuso. Novartis Pharmaceuticals Corporation se compromete a ayudarlo a conseguir los medicamentos que necesita. AfiniTRAC® ofrece herramientas y se diseñó específicamente para facilitar el proceso.

¿Qué es AfiniTRAC?

AfiniTRAC es un programa de apoyo para pacientes elegibles que toman AFINITOR DISPERZ® (everolimus) Comprimidos o AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral).

El programa ofrece apoyo telefónico personalizado directamente a los pacientes a través de AfiniTRAC Care Champions.

AfiniTRAC Care Champions ofrece ayuda instructiva completa, que incluye asistencia con un tratamiento de rutina y recordatorios a los pacientes para que tomen el medicamento según la prescripción.

Los recursos de apoyo diarios adicionales para pacientes pueden proporcionar información sobre una variedad de organizaciones de ayuda independientes que ofrecen servicios para complementar su atención médica, desde transporte y comidas hasta limpieza del hogar.



La información que se obtiene mediante el programa AfiniTRAC no está destinada a sustituir el asesoramiento y la orientación de su equipo de atención sanitaria.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

28 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.

Cuál es la ayuda que ofrece el Care Champion

- Su Care Champion puede ayudarlo de diferentes formas
- Información sobre la asistencia financiera que pueda haber disponible
- Ayuda para saber cuáles son las farmacias que cubren su plan
- Ayuda para comprender la cobertura del seguro médico y de Medicare
- Llamadas telefónicas que se adaptan a su cronograma
- Información sobre el medicamento
- Ayuda para crear una dosificación personalizada y una rutina del horario de las comidas
- Servicios de traducción en más de 160 idiomas



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

AFINITOR DISPERZ OFRECE EL APOYO PARA PACIENTES QUE USTED NECESITA (continuación)

AfiniTRAC[®] Care Champions

Cuando se registre para AfiniTRAC, se lo pondrá en contacto con un Care Champion quien le brindará ayuda e información durante todo su tratamiento con AFINITOR[®] (everolimus) Comprimidos o AFINITOR DISPERZ[®] (comprimidos de everolimus para suspensión oral).

“ ¿Qué ayuda ofrece AfiniTRAC?

*Recientemente, ayudé a una paciente que había comenzado a tomar AFINITOR. En el primer mes de tratamiento, se mudó, cambió de médicos y adquirió una nueva póliza de seguro. Pude ayudar a la paciente durante todo el proceso sin que se saltara ninguna dosis.**

—Robin, AfiniTRAC Care Champion

* Esto no representa el resultado de cada paciente.

”



Yuri Shevtsov/Shutterstock

¿Cómo me inscribo en el programa AfiniTRAC?

AfiniTRAC:

Apoyo personalizado
en **solo 3 pasos**

1. Solicite a su médico un formulario de inscripción de AfiniTRAC
2. Complete el formulario y fírmelo (deben hacerlo usted y su médico)
3. Envíe un fax al **1-877-705-2282**

Si necesita ayuda, llame al **1-888-923-4648**, o visite **AFINITOR.com**

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

29 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

RECURSOS ADICIONALES PARA PACIENTES

Como miembro de AfiniTRAC, tiene varios recursos disponibles, incluidos:



PROGRAMA DE PRUEBA GRATIS: los pacientes elegibles pueden recibir un suministro gratis por 7 días de AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral) hasta que se completen las revisiones de la cobertura (si es elegible; hay restricciones).



TARJETA DE COPAGO DE AFINITOR DISPERZ: puede ser elegible para recibir ahorros de copago inmediatos en su próxima receta.

- Los pacientes elegibles con seguro médico privado pagan \$0 por mes
- Novartis pagará el copago restante, hasta \$15,000 por año calendario, por producto*

*Se aplican restricciones. Esta oferta solo está disponible para pacientes con cobertura privada. El programa no es válido para los pacientes que estén inscritos en el programa de Medicare, Medicaid o cualquier otro programa de atención médica federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este programa sin aviso. Para conocer todos los Términos y Condiciones, visite Copay.NovartisOncology.com o llame al 1-877-577-7756.

Para saber si es elegible para el Programa de copago universal, llame al **1-877-577-7756** o visite **Copay.NovartisOncology.com**.

ASISTENCIA FINANCIERA: existen otras formas de ayuda para que su tratamiento con AFINITOR DISPERZ sea lo más asequible posible. Visite **www.us.AFINITOR.com** para obtener más información.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

30 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

RECURSOS ADICIONALES PARA PACIENTES (continuación)

MANTÉNGASE EN CONTACTO

A menudo, usted es quién mejor sabe cuidarse. Lo animamos a que se mantenga en contacto con su médico. También le recomendamos que continúe informándose sobre su afección y su tratamiento a través de los recursos en línea y los programas de apoyo que ofrecemos.



Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra en todo el folleto.

31 [Haga clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa de AFINITOR DISPERZ, incluida la Información del paciente.



Más información en www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures

Visite www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures para obtener más información y descargue el material útil

www.us.AFINITOR.com/tsc-seizures tiene material gratuito que lo ayudará a saber más sobre las convulsiones por CET y AFINITOR DISPERZ® (comprimidos de everolimus para suspensión oral).

Puede imprimir este material para tener esta información útil a mano. Recuerde llevarlo cuando vaya al médico ya que será de ayuda durante sus conversaciones.

MÁS ALLÁ DEL CET CON CONVULSIONES,
ESTÁ USTED.

